

رياضيات النجاح	المعادلات التفاضلية			السنة 2 بكالوريا علوم تجريبية
تمرين 1 : حل المعادلات التفاضلية التالية :				
$y = y' + 3$	$2y' - 10y = 1$	$y' + 2(y + 3) = 0$	$y' - 5y = 0$	
تمرين 2 : حل المعادلات التفاضلية التالية :				
$y'' + 5y' + 4y = 0$	$y'' + 6y' + 9y = 0$	$y'' + 2y' - 3y = 0$		
$y'' - y' = y' - y$	$2y'' + y' - y = 0$	$y'' + 4y = 0$		
تمرين 3 :				
(1) حل المعادلة التفاضلية : $(E): y' = 2y - 6$				
(2) أوجد الدالة $h(x)$ التي تحقق المعادلة السابقة بحيث : $h(0) = 5$				
تمرين 4 :				
(1) حل المعادلة التفاضلية : $(E): y' = 3y - 7$				
(2) أوجد الدالة $h(x)$ التي تحقق المعادلة السابقة بحيث : $h'(0) = 6$				
تمرين 5 :				
(1) حل المعادلة التفاضلية : $(E): y'' - 4y' = -4y$				
(2) أوجد الحل h للمعادلة السابقة الذي يحقق : $h(0) = -6$ و $h(3) = 0$				
تمرين 6 :				
(1) حل المعادلة التفاضلية : $(E): y'' - 5y' + 4y = 0$				
(2) أوجد الحل h للمعادلة السابقة الذي يحقق : $h(0) = 1$ و $h'(0) = 2$				
تمرين 7 : نعتبر المعادلة التفاضلية $(E): y' = -3y + 4e^{-2x}$				
(1) حدد العدد الحقيقي $\{$ بحيث تكون الدالة g المعرفة على IR بما يلي : $g(x) = \}$ حلا للمعادلة (E)				
(2) لتكن f و h دالتان معرفتان على IR حيث : $f(x) = h(x) + 4e^{-2x}$ ، ونعتبر المعادلة التفاضلية $(E'): y' = -3y$				
بين أن : f حل للمعادلة التفاضلية : (E) إذا وفقط إذا كانت h حل للمعادلة التفاضلية : (E')				
(3) حل المعادلة التفاضلية (E')				
(4) استنتج حلول المعادلة التفاضلية (E)				
تمرين 8 :				
f دالة عددية تحقق : $\begin{cases} f'(x) = 2f(x) - 2 \\ f(0) = 0 \end{cases}$ احسب : $f(\ln(2))$				